

Virocid®

Presidio Medico Chirurgico Reg. MINSAL N. 19726

Potere disinfettante
al doppio decimale

Non corrosivo
nei confronti di materiali, vernici e metalli

Efficacia dimostrata
a bassa concentrazione
d'impiego

Attività biocida immediata
e protratta nel tempo anche per applicazione schiumogena



Biosicurezza
in allevamento?



Testa tra le nuvole
e piedi per terra



facebook.com/pages/Unitec-Srl



canale: Unitec srl



info@unitecitalia.it



twitter.com/UnitecItalia



www.biosicurezzaweb.net



02 4694323

Virocid®

Disinfettante a formulazione “multitasking”
ad ampio spettro virucida, biocida e fungicida



Composizione

Formulazione stabilizzata di poliquaternari d'ammonio di V generazione, glutaraldeide, alcool isopropilico, oli essenziali di pino, additivi ad azione tampone e coadiuvanti tecnologici



pH soluzione 1%

7,0



Tempo contatto

Da 5 a 15 minuti



Formati

Flacone 1 litro
Tanica 5 e 20 litri
Cisterna 600 litri



Validità

36 mesi dalla data di produzione



Diluizioni efficaci

Disinfezione di superficie in condizioni di alto rischio sanitario

5 ml di Virocid® per litro d'acqua (0,5%)

Disinfezione di superficie in condizioni di basso rischio sanitario

2,5 ml di Virocid® per litro d'acqua (0,25%)

Disinfezione di superficie per applicazione schiumogena

5 ml di Virocid® per litro d'acqua (0,5%)

Disinfezione di volume per applicazione termonebbiogenica

1 litro di Virocid® per 1000 metri cubi ($T^{\circ} > 20^{\circ}\text{C}$)



Aspetto

Liquido limpido color marrone
caratterizzato da odore tipico



Normativa

Regolamento UE 528/2012

(Prodotti Biocidi)

Tipo Prodotto: PT 3 (igiene veterinaria)



Impiego & Attrezzatura

Disinfezione di superficie

300 ml di soluzione disinfettante allo 0,5%/0,25% per metro quadrato di superficie disinfettabile

Lancia di disinfezione ugello getto a ventaglio

Lancia schiumogena

Termonebbiogeno



Applicazioni target

Disinfezione di superficie. Disinfezione di calzature e indumenti professionali. Disinfezione di automezzi e veicoli aziendali. Disinfezione di incubatoi e igiene delle uova.



Pittogrammi CLP

