

SCHEDA TECNICA

ULTRADIFFUSION®

DISINFEZIONE BATTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA DELLE SUPERFICI PER VIA AEREA

Prodotto pronto per l'uso Solo per uso professionale PER ALLEVAMENTI

USO

Uso Biocida (tipo prodotto 3 e tipo prodotto 4 –FEED) : Disinfettante battericida, fungicida e virucida.

TPO3 Locali e materiale da allevamento, materiale per il trasporto di animali domestici.

TPO4 Locali e materiale da stoccaggio e per la produzione di derrate destinate agli animali domestici.

INDICAZIONE

Trattamento battericida, fungicida e virucida per la disinfezione delle superfici per via aerea.

- Locali da allevamento: disinfezione contro *Salmonelle* e altri enterobatteri, *Stafilococchi*, *Enterococchi*, *Listeria* e *Pseudomonas*. Prevenzione contro le muffe del genere *Aspergillus*. Efficace sul Coronavirus (coronavirus umano 229E).
- Incubatori : disinfezione delle uova a covare.
- Incubatori : disinfezione contro *Salmonelle* e altri enterobatteri. Prevenzione contro le muffe del genere *Aspergillus*. Efficace sul Coronavirus (coronavirus umano 229E).
- Silos : disinfezione contro *Salmonelle* e altri enterobatteri. Prevenzione delle muffe e della formazione di micotossine.

AZIONE

Battericida/Fungicida/Virucida

Vedere la tabella § EFFICACIA

Il prodotto **FUMAGRI® HA** va liberato nell'ambiente da trattare in assenza di operatori, una materia disinfettante (acido glicolico) che agisce a contatto con i batteri, i lieviti, i muffe e le virus.

PRINCIPIO ATTIVO

Acido glicolico - 40g/kg (4%)

OMOLOGAZIONE

FUMAGRI®HA - N° 19962

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

- Trattare senza presenza umana e animale
- Trattare senza presenza di derrate alimentari.
- Chiudere qualsiasi fonte di gas infiammabili.
- Scollegare cellule fotoelettriche.
- Siccome il prodotto genera fumo, i sistemi di rilevamento fumo devono essere adattati durante il funzionamento.
- Spegnere gli impianti di ventilazione.
- Coprire gli strumenti sensibili al fumo e i gli strumenti analitici con sensori.
- Chiudere tutte le uscite del locale.
- Pulire le superfici prima del trattamento.
- Scompattare la polvere.
- Posizionare le dosi su un supporto resistente alle alte temperature e lontane da materiali combustibili.
- Aprire la capsula, accendere la miccia ed uscire dal locale.
- Mantere il locale chiuso.
- Segnalare il divieto di ingresso nelle area trattata.

- Tempo di contatto : 15 ore.
- Ventilare per rinnovare il 90% dell'atmosfera dell' ambiente» (da 30 minuti a 1 ora).
- I locali possono essere riutilizzati per la produzione ad avvenuto ricambio d'aria ed eventuale risciacquo delle superfici
- Osservare un intervallo di almeno 24 ore tra due trattamenti successivi.

SICUREZZA

- **FUMAGRI® HA** è classificato ai sensi del reg. (CE) n° 1272/2008:
- **Provoca grave irritazione oculare Cat.2 H319**

Consigli di prudenza

- Non respirare i fumi
- Indossare proteggere gli occhi/il viso.
- Lavare accuratamente mani dopo l'uso.
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- In caso di irritazione o eruzione della pelle : consultare un medico.

Informazioni di sicurezza

- Consultare la Scheda dei Dati di Sicurezza e le istruzioni scritte sull'etichetta del prodotto
- Consultare il proprio fornitore e seguire le sue raccomandazioni specifiche.

Per la sicurezza dell'applicatore

- Non c'è esposizione per l'applicatore, il prodotto si diffonde in modo autonomo.
- Indossare dei guanti per ritirare le dosi utilizzate

Per la sicurezza dell'operatore

- Nei locali normalmente ventilati: non esiste esposizione per l'operatore.
- Nei locali non ventilati e confinati: consultare il proprio fornitore.

EFFICACIA MEDIANTE TRATTAMENTO OCCASIONALE

- **Spettro battericida e fungicida alla dose di 0,8g/m³.**
- **Spettro virucida alla dose 1,2g/m³.**

Efficienza richiesta: riduzione di 5 unità logaritmiche per l'efficacia battericida e di 4 unità logaritmiche per l'efficacia fungicida e virucida.

EFFICACIA con un trattamento alla dose 0,8 g/m ³ , durante 15 ore secondo la norma NF T 72- 281.	
CEPPO TESTATO	EFFICACIA OTTENUTA
<i>Pseudomonas aeruginosa - DSM939</i>	> 6.83
<i>Candida albicans - DSM1386</i>	> 6.27
<i>Aspergillus brasiliensis - DSM1988</i>	> 5.34
<i>Enterococcus hirae - DSM3320</i>	6.04
<i>Salmonella enterica subsp enterica serotype choleraesuis CIP 104220</i>	> 5,84
<i>Staphylococcus aureus - DSM799</i>	> 7.48
<i>Proteus vulgaris - CIP 58 60</i>	6,11
<i>Aspergillus fumigatus - IP 865 64</i>	6,19*
<i>Cronobacter sakasaki - ATCC 29544</i>	5,79
<i>Salmonella heidelberg - DSM9379</i>	> 7,97

ULTRADIFFUSION®

<i>Listeria monocytogenes</i> - CIP 103.322	> 7,34
<i>Escherichia coli</i> - DSM682	> 5.55
<i>Aspergillus flavus</i> - CIP 597 69	4,6
<i>Eurotium repens</i> - wild strain	> 4,6

(*) : Efficacia ottenuta per 2 ore di tempo di contatto

EFFICACIA con un trattamento alla dose 1.2 g/m³ (in presenza di 3g/l di albumina bovina), durante 15 ore secondo la norma NF T 72- 281.

CEPPO TESTATO	RESULT
<i>Bovine type 1 Enterovirus (ECBO)</i>	conforme

EFFICACIA con un trattamento alla dose 1,2 g/m³, durante 15 ore secondo la norma EN 17272

CEPPO TESTATO	RESULT
<i>Porcine parvovirus*</i>	conforme
<i>Human Coronavirus E229***</i>	conforme
<i>Staphylococcus aureus (distribution test)***</i>	conforme
<i>Avian Influenza H5N2</i>	conforme

(*) in presenza di 3g/l di albumina bovina,

(***) in presenza di 0,3g/l di albumina bovina e in presenza di 3g/l di albumina bovina,

CONFEZIONI

DESCRIZIONE	IMBALLO	VOLUME D'IMPIEGO (per un dosaggio di 1g/m ³)
FUMAGRI® HA 15g	Cartone da 24 scatole	15 m ³
FUMAGRI® HA 50g	Cartone da 12 scatole	50 m ³
FUMAGRI® HA 100g	Cartone da 12 scatole	100 m ³
FUMAGRI® HA 200g	Cartone da 12 scatole	200 m ³
FUMAGRI® HA 400g	Cartone da 6 scatole	400 m ³
FUMAGRI® HA 1000g	Cartone da 4 scatole	1 000 m ³

CARATTERISTICHE PSICO-CHIMICHE

Polvere di colore bianco

CONSERVAZIONE/SCADENZA

Stoccaggio : Fino a 2 anni in ambiente asciutto

DLU : 2 anni

Tutte le informazioni tecniche comunicate nel presente documento sono basate su dati tecnici attualmente disponibili, che LCB food safety considera attendibili. Sono destinate a utilizzatori esperti che agiscono a loro discrezione e a proprio rischio e pericolo. Le precauzioni per la manipolazione espresse in questo documento sono fornite sulla supposizione che gli utilizzatori si assicurino che le condizioni di impiego particolari non presentino nessun rischio per la salute e la sicurezza. Nella misura in cui le condizioni di impiego del prodotto sfuggano al nostro controllo, rifiuteremo qualsiasi garanzia, espressa o implicita a questo riguardo e decliniamo qualsiasi responsabilità in quanto all'uso fatto di queste informazioni. Utilizzare FUMAGRI® HA con precauzione. Prima dell'uso leggere l'etichetta e le informazioni in riguardo al prodotto.