

Virocid®

IL DISINFETTANTE N.1 PER MOLTE RAGIONI!

Nel mondo della produzione di oggi, una disinfezione efficiente e continua è una priorità assoluta. Le malattie virulente non solo scremano i profitti, ma possono persino colpire un intero settore. Un grammo di prevenzione vale un kilogrammo di cura!

Dove viene applicato Virocid®, batteri, virus, funghi e spore non hanno alcuna possibilità. Investire nella biosicurezza di animali, strutture, materiali, edifici, veicoli e persone è una decisione manageriale prudente. Conduce al miglioramento dei risultati di produzione e può prevenire le malattie..

Più grandi e intensivi diventano gli allevamenti, maggiore è il rischio di malattie virulente.

L'efficacia battericida, virucida, fungicida e sporicida di Virocid® è unica al mondo ed è sicura per persone, animali, attrezzature e ambiente..



AMBIENTE

BIODEGRADABILITÀ

Virocid® è biodegradabile per oltre il 90% entro 28 giorni, secondo la direttiva 84/449/CEE della Commissione Europea e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse).

Non lascia nessun residuo di metalli pesanti o triometani.

Virocid® utilizzato per la disinfezione degli edifici agricoli non influenza l'attività negli impianti di biogas.

INTERVALLO DI TEMPERATURA

Virocid® può essere utilizzato tra 4° e 60°C, e anche a temperature di congelamento, aggiungendo glicole propilenico.

Testato anche in acqua di mare (CFR Test University of Bergen, Norvegia). Test disponibile su richiesta.

STABILITÀ

La diluizione dello 0,5% (1:200) e dell'1% (1:100) è stabile in acqua a 6°C (43 F), 25°C (77 F) e 40°C (104 F) per 4 settimane.

Il concentrato ha una durata di conservazione di 3 anni, ad una temperatura media di 25°C.

ATTREZZATURE

Virocid® è omologato VDA come non corrosivo di classe A, fino ad una concentrazione dell'1%.

(VDA = Associazione tedesca dell'industria automobilistica)



I prodotti con omologazione VDA soddisfano i più elevati standard di qualità tedeschi, il che significa che non sono corrosivi per i veicoli, nemmeno nel lungo periodo.

SUPERFICI

NON CORROSIVO


Virocid® allo 0,5%, dopo 1000h di immersione non provoca corrosione sulle superfici comunemente utilizzate nelle industrie zootecniche, e quindi può essere utilizzato in totale sicurezza.

TIPO DI SUPERFICIE	PERDITA DI PESO % dopo 1000H	VALORE DI CORROSIONE mm/anno dopo 1000H
Rame	0,056%	0,0020
Ottone	0,062%	0,0026
Alluminio anodizzato	0,13%	0,0027
Acciaio zincato	0,000%	0
Corrosione se *	> 80%	> 6,25

Test di corrosività effettuato presso il laboratorio CIRLAM sulla base delle linee guida UN n. ST/SG/AC.10/11/Rev.4.

*In base alla normativa ADR, un valore di 0,1 mm/anno corrisponde ad un principio di corrosione percepibile alla vista.


Virocid® ha un pH neutro in diluizione.



INNUMEREVOLI APPLICAZIONI

Virocid® può essere applicato in modo versatile, senza dover aggiungere additivi:

SCHIUMA



Una lancia schiuma ad alta pressione (min. 40 bar) o media pressione con aria compressa (25 bar) è sufficiente per ottenere la schiuma con Virocid® senza aggiungere alcun additivo. Una bella schiuma bianca mostra se ogni punto è stato coperto. Inoltre, garantisce un tempo di contatto più lungo, e pertanto risultati di disinfezione superiori.

Diluizione: 0,25-0,5%

BAGNI PER STIVALI



Virocid® è ideale per i bagni degli stivali. Se le vaschette sono adeguatamente utilizzate e situate in zone strategiche, sono una buona misura aggiuntiva per la biosicurezza in azienda.

Diluizione: 0,5-1%.

SPRAY



Virocid® può essere spruzzato tramite sistemi spray manuali o PTO.

Diluizione: 0,25-0,5%.

AUTOMEZZI



Virocid® è omologato VDA, l'associazione tedesca dell'industria automobilistica, come "non corrosivo di Classe A". I prodotti con omologazione VDA soddisfano i più elevati standard di qualità tedeschi, il che significa che non sono corrosivi per i veicoli, nemmeno nel lungo periodo.

Diluizione: 0,25-1%.

TERMONEBULIZZAZIONE



Non è necessario aggiungere un "agente di trasporto" per nebulizzare Virocid®. Le piccole particelle nell'aria consentono una "disinfezione aerea". Sono disponibili prove di "non corrosività" per termonebbiogeni di diverse case produttive.


Diluizione: 1-2L di prodotto +3 L di acqua ogni 1000 m³.

UOVA IN INCUBATOIO*



Virocid® può essere applicato in alternativa alla formaldeide (cancerogena) attraverso il nostro speciale ugello. Testato su centinaia di migliaia di uova (ove consentito)!

Diluizione: 10% attraverso uno speciale ugello.



Contatta il tuo rappresentante CID LINES o il tuo rivenditore di zona per maggiori informazioni.

Guarda i nostri video applicativi su youtube.
www.youtube.com/cidlines

TUTTI I TEST DI EFFICACIA SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA O ALL'INTERNO DEL SITO WEB WWW.VIROCID.COM

